LIQUA-TOX II
RODENTICIDE

Mélanger le contenu d'un sachet avec un litre d'eau

TUE LES RATS ET LES SOURIS

NO. D'HOM.: **23720** L.P.A.

DOMESTIQUE

ATTENTION POISON

GARANTIE:
Diphacinone sous forme de sels de sodium……0,106%

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI
(pour détails supplémentaires sur la sécurité, voir verso)
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

CONTENU NET: 49,58 ml

Fabriqué par: Bell Laboratories, Inc., 3699 Kinsman Blvd., Madison, WI 53704 USA
Tél: 608-241-0202

PRÉCAUTIONS: GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Peut être nocif ou létal si ingéré ou absorbé par la peau. Porter des gants de caoutchouc lors de la manipulation du produit et de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.

SPECIMEN LABEL

PREMIERS SOINS: En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes. **En cas de contact avec la peau,** laver à l'eau et au savon. **En cas d'ingestion,** faire boire un ou deux verres d'eau et PROVOQUER LE VOMISSEMENT en touchant le fond de la gorge avec les doigts ou un objet arrondi; faire vomir jusqu'à ce que le liquide vomi soit clair. Ne rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Signaler immédiatement à un médecin ou à un centre antipoison tous les cas d'ingestion de ce produit. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est suspecté. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: La vitamine K_1, par injection intramusculaire ou sous-cutanées, ou par ingestion orale, est conseillée comme remède curatif pour l'empoisonnement par un anticoagulant. La gravité du cas mesurée par l'établissement du temps de prothrombine prolongé (P.T.) déterminera la thérapie appropriée. La surveillance du temps de prothrombine indiquera si des traitements répétés s'imposent.

RISQUES POUR L'ENVIRONMENT: Ce produit est toxique pour les poissons et la faune. Ne pas laisser ce produit se répandre dans les lacs, les rivières ou les étangs.

MODE D'EMPLOI: Utiliser les appâts pour éliminer le rat surmulot (*Rattus norvegicus*), le rat noir (*Rattus rattus*) et la souris commune (*Mus musculus*) à l'intérieur et le long des murs extérieurs des immeubles.

RESTRICTIONS D'UTILISATION: L'appât DOIT être placé dans un point d'appât protégé ou dans un endroit hors de portée des enfants, des animaux de compagnie ou des animaux d'élevage. NE PAS placer l'appât là où il risquerait de contaminer des aliments ou encore sur des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

CHOIX DES LIEUX DE TRAITEMENTS: Déterminer les lieux où les rats et/ou les souris seront les plus susceptibles de trouver et de boire les appâts. Habituellement, ce sont les endroits situés le long des murs, près d'ouvertures rongées, dans ou à côté des terriers, dans les coins ou des endroits cachés, entre les planchers et les murs, ou là où les rongeurs ou leurs traces ont été observés. Retirer rapidement tout appât gâté ou contaminé.

MÉLANGE: Avec les ciseaux, couper un sachet à l'endroit indiqué et verser son contenu dans un litre d'eau. Mélanger très bien le LIQUA-TOX II et l'eau.

MODE D'APPLICATION

RATS: Placer un minimum de 500 ml d'appât dilué dans chaque distributeur. Si la zone infestée est grande ou si la population de rats est élevée, utiliser des distributeurs à plusiers endroits. Espacer les distributeurs et les remplir au besoin afin de s'assurer que l'appât est disponible dans tous les endroits infestés où il peut être utilisé sans risque pour les espèces non visées.

SPECIMEN LABEL

SOURIS: Placer 250 ml du mélange d'appât dilué dans des stations d'appât convenablement équipées. Placer les distributeurs à des intervalles de 2,5 - 4 mètres (8 - 12 pieds) dans tous les endroits infestés où l'appât peut être utilisé sans risque pour les espèces non visées.
RATS/SOURIS: Remplacer immédiatement les appâts contaminés ou gâtés. Jeter les appâts non utilisés ou avariés et les animaux morts conformément aux exigences locales. Continuer les placements aussi longtemps que les espèces visées sont contrôlées par l'appât et qu'il n'y a pas de risque pour les espèces non visées.

ÉLIMINATION: Ne pas réutiliser le contenant vide. Jeter le contenant aux ordures ménagères.
Élimination des rongeurs: Jeter les rongeurs morts avec les ordures ménagères ou les enterrer.
ENTREPOSAGE: Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Ranger la portion inutilisée du produit dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr à l'abri des enfants et des animaux non ciblés.

AVIS À L'UTILISATEUR: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

020507

SPECIMEN LABEL